

2026年度

C_a 数 学 問 題

注 意

1. 試験開始の指示があるまでこの問題冊子を開いてはいけません。
2. 解答用紙はすべて黒鉛筆または黒芯のシャープペンシルで記入することになっています。黒鉛筆・消しゴムを忘れた人は監督に申し出てください。
(万年筆・ボールペン・サインペンなどを使用してはいけません。)
3. この問題冊子は12ページまでとなっています。試験開始後、ただちにページ数を確認してください。なお、問題番号はⅠ～Ⅳとなっています。
4. 解答用紙にはすでに受験番号が記入されていますので、あなたの受験票の番号であるかどうかを確認してください。あなたの氏名を記入する必要はありません。
5. 解答は解答用紙の指定された解答欄に記入し、その他の部分には何も書いてはいけません。
6. 解答用紙を破ったり、傷つけたりしないように注意してください。
7. 計算には、この問題冊子の余白部分を使ってください。
8. この問題冊子は持ち帰ってください。

I . 下記の空欄ア～クにあてはまる数または式を解答用紙の所定欄に記入せよ。

- (i) i を虚数単位とする。 $0 < \beta < \alpha < \pi$ を満たす実数 α, β に対し、2つの複素数を $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, $w = \cos \beta + i \sin \beta$ とする。 $z - w$ の絶対値が $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ であるとき、 $\alpha - \beta =$ である。
- (ii) 1個のさいころを2回投げ、1回目に出た目の数を a , 2回目に出た目の数を b とする。このとき、2次方程式 $x^2 - ax + b = 0$ が重解をもつ確率は であり、また、異なる2つの整数を解にもつ確率は である。
- (iii) O を原点とする座標空間において、2点 $A(3, 2, 1)$, $B(0, -1, 4)$ を通る直線に、 O から垂線 OH を下ろす。このとき、点 H の座標は である。
- (iv) 1個のさいころを100回投げるとき、1の目が出る回数を X とする。試行回数100を十分に大きいと考えると、 X は近似的に平均 , 標準偏差 の正規分布に従う。
- (v) 座標平面において、点 $(\sqrt{3}, 0)$ を中心とする半径 r の円を C とする。直線 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ に関して C と対称である円を C' とする。 C と C' が外接するとき、 $r =$ であり、 C' の中心の座標は である。

Ⅱ. p を正の実数とする。O を原点とする座標平面上に曲線 $C_1: y = \frac{1}{x}$ と曲線 $C_2: y = -\frac{3}{x}$ がある。また、 C_1 上の点 $P\left(p, \frac{1}{p}\right)$ における C_1 の接線を ℓ とおき、 ℓ と C_2 の2つの共有点を Q_1, Q_2 とする。ただし、 Q_1 の x 座標は正とする。

点 Q_1, Q_2 における C_2 の接線をそれぞれ m_1, m_2 とおき、 m_1 と m_2 の交点を R とする。また、 $\overrightarrow{RQ_1}$ と $\overrightarrow{RQ_2}$ のなす角を θ ($0^\circ < \theta < 180^\circ$) とする。このとき、以下の問 (i) ~ (v) に答えよ。解答欄には、(i) ~ (iii) については答えのみを、(iv), (v) については答えだけでなく途中経過も書くこと。

(i) Q_1, Q_2 の座標をそれぞれ p を用いて表せ。

(ii) m_1, m_2 の方程式をそれぞれ p を用いて表せ。

(iii) R の座標を p を用いて表せ。

(iv) $t = p^2 + \frac{1}{p^2}$ とおく。内積 $\overrightarrow{RQ_1} \cdot \overrightarrow{RQ_2}$ を t を用いて表せ。

(v) p がすべての正の実数を動くとき、 $\cos \theta$ の最小値とそのときの p の値をそれぞれ求めよ。

Ⅲ. n と k を自然数とする。実数 x に対し、関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$$

により定める。 $f_n(x)$ の最大値を M_n とし、最大値をとる x の値を x_n とする。また、

$$S_{k,n} = \int_0^{x_n} f_k(x) dx$$

とする。このとき、以下の問(i)～(v)に答えよ。解答欄には、(i)、(ii)、(iv)については答えのみを、(iii)、(v)については答えだけでなく途中経過も書くこと。

(i) x_n , M_n をそれぞれ n を用いて表せ。

(ii) $S_{1,1}$ の値を求めよ。

(iii) $S_{k,n}$ を n , k を用いて表せ。

(iv) $\frac{1}{M_n} \sum_{k=1}^n S_{k,n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right)$ となるような関数 $g(x)$ を求めよ。ただし、 $g(x)$ は n に無関係な連続関数とする。

(v) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{M_n} \sum_{k=1}^n S_{k,n}$ の値を求めよ。

IV. i を虚数単位とし、複素数 α を

$$\alpha = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}i}{4}$$

とする。また、自然数 n に対し、複素数 z_n を次のように定める。

$$z_1 = 4i, \quad z_{n+1} = \alpha z_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

さらに、 z_n の虚部を a_n とする。このとき、次の問(i)～(v)に答えよ。解答欄には、(i)、(ii)については答えのみを、(iii)～(v)については答えだけでなく途中経過も書くこと。ただし、複素数 z の偏角 $\theta = \arg z$ の範囲は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

(i) α の絶対値と偏角をそれぞれ求めよ。

(ii) z_2, z_3, z_4 の絶対値と偏角をそれぞれを求めよ。

(iii) 自然数 n に対して、 a_{n+3} を a_n を用いて表せ。

(iv) 自然数 n に対し

$$S_n = \sum_{k=1}^{3n} a_k$$

とおく。このとき、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ の値を求めよ。

(v) 複素数平面上の3点 $A(-i)$, $B\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)$, $C\left(\frac{-\sqrt{3}+i}{2}\right)$ を頂点とする正三角形およびその内部を D とする。このとき、 z_n が表す複素数平面上の点 P_n が D に含まれるような最小の自然数 n を求めよ。

【以下余白】

